

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ БИЛИАРНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Краснов А.В.

Научный руководитель: доктор мед. наук, проф.
Н.З. Зокиров

Академия постдипломного образования Федерального
научно-клинического центра специализированных
видов медицинской помощи и медицинских технологий
Федерального медико-биологического агентства, Москва,
Россия

Ключевые слова: дети; билиарная дисфункция;
распространённость; диагностика

Актуальность. В последние годы отмечается рост числа функциональных заболеваний органов пищеварения у детей, особенно в школьной возрастной группе. Самой распространённой является группа расстройств, сопровождаемых абдоминальной болью, среди которой выделяются билиарные дисфункции (БД). Распространённость БД возрастает с увеличением возраста пациентов. У взрослых она составляет 10–20%, в то время как у детей этот показатель в среднем равен 5,5%.

Цель работы: определить распространённость БД у детей в возрасте 8–17 лет.

Материалы и методы. Проведено одномоментное исследование электронных медицинских карт детей в возрасте 8–17 лет, у которых был установлен основной или сопутствующий диагноз БД в 2020–2023 гг.

Результаты. БД выявлена у 444 детей, что составляет 3,19% общего числа школьников в возрасте 8–17 лет. Из них БД была диагностирована у 239 (3,6%) девочек и у 205 (2,8%) мальчиков. Анализ возрастной структуры показал, что средний возраст детей с БД — $14,00 \pm 0,49$ года.

Заключение. Распространённость БД среди детей в возрасте 8–17 лет ниже, чем в аналогичных работах. Анализ возрастной структуры показал, что БД чаще наблюдаются в подростковом возрасте. Это может быть обусловлено увеличением учебной нагрузки, изменением рациона питания и стилем жизни в этот период. Влияние этих факторов может вызывать нарушения в функционировании желудочно-кишечного тракта и способствовать развитию БД.

* * *