

* * *

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЁЗОМ ПОДРОСТКОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Степанова Ю.Н., Богодухова Е.С., Байке Е.Е.

Читинская государственная медицинская академия
Минздрава России, Чита, Россия

Ключевые слова: подростки; эпидемиология;
туберкулёз; диагностика; профилактика

Актуальность. Заболеваемость туберкулёзом подростков, по данным на 2023 г., в Северном федеральном округе имеет тенденцию к росту, а в Дальневосточном федеральном округе — к снижению: с 24,8 до 21,6 на 100 тыс. подростково-

го населения. В Забайкальском крае отмечено снижение регистрации заболеваемости детей: с 15,0 до 12,5 на 100 тыс. подросткового населения.

Цель работы: провести анализ эпидемической ситуации по туберкулёзу среди подростков в Забайкальском крае за 2021–2023 гг.

Материалы и методы. Проведён скрининг данных карт амбулаторного учёта на базе краевого клинического фтизиопульмонологического центра среди 3 групп диспансерного учёта подростков. Дети были разделены на 2 группы: 1-ю группу составили дети, проживающие в городе, во 2-ю группу вошли подростки, проживающие в разных регионах края.

Результаты. Общее число обследованных — 115. Возрастной диапазон распределился следующим образом: в 2021 г. на первом месте (50%) — 25 человек 18-летнего возраста, далее — 16 (14%) человек 16 лет. В 2022 г. — на 1-м месте лица 17-летнего возраста — 46,8% (15 детей), меньше всего 15 лет — 18,7% (6 детей). В 2023 г. на 1-м месте были лица 18-летнего возраста — 39% (13 детей). Среди клинических форм туберкулёза в 2021 г. у 30 (60%) подростков был туберкулёз внутригрудных лимфатических узлов (ТВГЛУ). Очаговый туберкулёз диагностирован у 11 (22%) подростков, инфильтративный туберкулёз лёгких наряду с другими клиническими формами — у 9 (18%). За 2022 г. на 1-м месте был ТВГЛУ у 17 (53%) подростков, на 2-м — очаговый туберкулёз у 11 (34%) детей, инфильтративный туберкулёз — у 1 (3%), другие формы туберкулёза выявлены у 3 (9%) подростков. В 2023 г. ТВГЛУ был зарегистрирован у 15 (45%) подростков, очаговый туберкулёз — у 11 (33%), инфильтративный туберкулёз лёгких наряду с другими клиническими формами — у 7 (21%).

Заключение. Отмечается снижение заболеваемости туберкулёзом подростков по сравнению с 2021 г. Для повышения эффективности профилактики туберкулёза необходимо ежегодное комплексное обследование, которое включает флюорографию лёгких с 15 лет, иммунодиагностику, качественный контроль специфической вакцинопрофилактики, тщательное обследование контактных детей и подростков в семьях с туберкулёзом и своевременное превентивное лечение.

* * *