

## ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ МИКОПЛАЗМЕННОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ С ОТЯГОЩЁННЫМ АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИМ АНАМНЕЗОМ

Беляева Е.В., Сажнев Н.В.

Научный руководитель: проф. А.И. Аминова

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России, (Сеченовский Университет), Москва, Россия

**Ключевые слова:** дети; микоплазменная инфекция; аллергия; диагностика; лечение

**Актуальность.** На фоне эпидемического подъёма микоплазменной инфекции (МПИ) много внимания уделяется анализу этого патогена. Доля *Mycoplasma pneumoniae* у детей составляет 10–16% случаев ОРВИ и до 40% внебольничных пневмоний. Имеются данные о том, что этот возбудитель может усугублять сопутствующие аллергические реакции, например, ринит и бронхиальную астму. **Цель работы:** определить особенности МПИ у детей с отягощённым аллергическим преморбидным фоном.

**Материалы и методы.** По данным инфекционного отделения были использованы выписки больных детей с МПИ (J15.7, A49.3); создана база неперсонифицированных данных, на основе которой проводился анализ материала. Среди 972 больных 62 ребёнка имели аллергические заболевания (1-я группа). Дети без аллергии включены во 2-ю группу. Различия считали значимыми при  $p < 0,05$ .

**Результаты.** При сравнении данных у больных с аллергией и без неё выявлено, что у первых значительно реже выявлялась МПИ ( $p < 0,005$ ). У больных 1-й группы в 12% случаев отмечался малопродуктивный кашель, у больных 2-й группы он отмечался в 88% случаев ( $p = 0,05$ ). Больные 1-й группы не жаловались на головную боль и головокружение ( $p = 0,026$ ), жёсткое дыхание наблюдалось у 1,6%, против 8,8% у детей 2-й группы ( $p = 0,048$ ). Мелкопузырчатые хрипы выслушивались в 1,6% случаев у детей 1-й группы и 9,2% случаев больных 2-й группы ( $p = 0,042$ ). Больные 1-й группы заболевали постепенно в 60,3% против 38,5% случаев и чаще выписывались с улучшением — 95,2% против 78,4% ( $p = 0,002$ ;  $p = 0,017$ ). У них реже выявлялась двусторонняя пневмония — 14,3% против 28,3% ( $p = 0,022$ ), и они реже переводились в другие больницы с осложнениями — 5,9% против 25,6% ( $p = 0,007$ ).

**Заключение.** Течение МПИ у детей с неблагоприятным преморбидным фоном имело более лёгкое и неосложнённое течение по сравнению с детьми без аллергических заболеваний.

\*\*\*