

ВЛИЯНИЕ ЭРАДИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ТЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ КРАПИВНИЦЫ

Тарасова С.И.

Научные руководители: проф. Р.Р. Кильдиярова,
С.Б. Зимин

Первый Московский государственный медицинский
университет имени И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет), Москва, Россия

Ключевые слова: *клинический случай; ребёнок;
крапивница; хеликобактерная инфекция;
антихеликобактерная терапия*

Актуальность. Хроническая крапивница — заболевание, характеризующееся развитием таких симптомов, как эритематозные волдыри (уртикарии) и/или ангиоотёки, которые сохраняются более 6 нед. Существует достаточное количество факторов, способных спровоцировать крапивницу, и один из них — хеликобактерная инфекция (*Helicobacter pylori* — *Hp*).

Описание клинического случая. Мальчик, 8 лет, был госпитализирован в педиатрическое отделение с диагнозом — аллергия неуточнённая. Сопутствующие заболевания: гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом нижней трети пищевода, хронический гастрит, ассоциированный с *Hp*, множественные эрозии желудка, катаральный дуоденит. Данные лабораторных исследований показали повышенный уровень IgE при нормальных уровнях СРБ, С3- и С4-компонентов комплемента. Ребёнку было прописано лечение цетиризином 5 мг 1 раз в день, а также эрадикационная терапия *Hp*-инфекции. Проведённое лечение оказало положительный эффект: проявления крапивницы в виде уртикарий, зуда и ангиоотёков полностью исчезли, в дальнейшем обострений не наблюдалось.

Заключение. Эрадикационная терапия *Hp*-инфекции имеет положительное влияние на частоту обострений крапивницы и может способствовать полному регрессу её симптомов, однако такой эффект достигается не у всех больных. Анти-*Hp*-терапия позволяет вывести ребёнка из обострения хронической крапивницы.

* * *