

СТАТУС ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ ДЕТЕЙ ДО 3 ЛЕТ

Низамова Д.И., Омарова А.А.

Научный руководитель:

к.м.н., доцент Н.А. Соловьева

Казанский государственный медицинский университет
Минздрава России, Казань

Ключевые слова: дети, иммунизация,
вакцинопрофилактика

Актуальность. Вакцинопрофилактика является инструментом борьбы с инфекционными болезнями. Эффект от иммунопрофилактики для многих инфекций достигается при охвате 95% в определённой группе населения. Формирование приверженности родителей вакцинации способствует повышению охвата иммунизацией детей и снижению количества отказов от профилактических прививок.

Цель: оценить состояние вакцинопрофилактики детей раннего возраста на педиатрическом участке и отношение родителей к иммунизации.

Материалы и методы. Проведён анализ историй развития 120 детей, достигших трёхлетнего возраста, и анкетирование их родителей.

Результаты. Установлено, что в возрасте 3 лет к первой группе здоровья были отнесены 33% детей, ко второй — 40%, к третьей — 27%. Среди заболеваний у детей 3 группы здоровья большую часть составила патология центральной нервной системы, в меньшей степени — болезни мочевыделительной системы, аллергические заболевания и др. Привиты по Национальному календарю профилактических прививок (НКПП) 59% детей, по индивидуальному календарю — 25%, медицинский отвод постоянный имели 10% детей, а родители 6% детей оформили отказ от вакцинации. Большинство (80%) опрошенных родителей были в возрасте до 30 лет, остальные — старше 30 лет. Из них 62% имели высшее образование, оставшиеся — среднее специальное. Анализ анкетирования родителей выявил, что 94% респондентов, считают, что вакцинация защитит их детей от инфекций, включённых в НКПП. Остальные родители отказываются от профилактических прививок, опасаясь побочных эффектов вакцин, расстройств аутистического спектра, «перезагрузки» иммунной системы ребенка. Часть родителей связывают отказ с информацией, поступившей из средств массовой информации и от медперсонала.

Выводы. Нами выявлено снижение иммунизации детей, достигших трёхлетнего возраста, на педиатрическом участке, что связано с наличием отклонений состояния здоровья детей и постоянными медицинскими отводами. Для снижения необоснованных отказов необходимо повысить приверженность родителей вакцинации путём качественного их информирования. На всех уровнях оказания медицинской помощи необходимо развешивать ненаучные «мифы» о вакцинопрофилактике.