

* * *

АНАЛИЗ ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ В КЫТМАНОВСКОМ РАЙОНЕ

Тюкина К.В., Финтяжева А.А.

Научный руководитель: проф. Е.В. Скударнов

Алтайский государственный медицинский университет
Минздрава России, Барнаул, Россия

Ключевые слова: *дети; грудное вскармливание; искусственное вскармливание*

Актуальность. Грудное вскармливание (ГВ) — единственный естественный вид кормления детей с рождения. Доказано, что у детей, находившихся на ГВ, снижается вероятность приобретения алиментарнозависимых, аллергических, хронических неинфекционных и инфекционных заболеваний, для них характерны оптимальные показатели физического, умственного и психомоторного развития. **Цель работы:** провести анализ характера вскармливания детей до года в Кытмановском районе Алтайского края и выявить причины перевода детей на искусственное вскармливание (ИВ).

Материалы и методы. Было проведено анкетирование матерей и анализ медицинской документации 51 ребёнка до года, проживающих в Кытмановском районе Алтайского края, из них 42 (82,3%) ребёнка родились доношенными, а 9 (17,7%) — недоношенными. 35 (68,6%) детей рождены естественным путем, 16 (31,3%) — абдоминальным родоразрешением. Анкета включала в себя вопросы о виде вскармливания, продолжительности ГВ, причинах перехода на ИВ, источниках информации о питании.

Результаты. В Кытмановском районе из 51 ребёнка до 1 года 18 (35,29%) детей находятся на ГВ, а 33 (64,7%) детей — на ИВ. 17 (33,3%) детей были переведены на ИВ в возрасте до 1 мес и 16 (31,4%) детей — в возрасте 2–6 мес. Причиной перехода на ИВ в 26 (78,8%) случаях был недостаток грудного молока у матери, в 3 (9%) — плохая прибавка в весе, в 2 (6%) — болезнь матери, в 2 (6%) — болезнь ребёнка. Анализ источников информации по вопросам вскармливания показал, что для 34 (66,7%) матерей из Кытмановского района основным источником информации является участковый врач-педиатр, 17 (33,3%) матерей пользуются различной информацией по вопросам вскармливания, размещённой в сети Интернет.

Заключение. В Кытмановском районе Алтайского края на ГВ до 1 мес находились 64,7% детей, до 6 мес — 33,3%. В 78,8% случаев причиной перевода на ИВ являлась гипогала-

лакти. Необходимо проводить комплексные мероприятия для
уменьшения частоты перевода детей на ИВ.

* * *