

сификацией. Результаты представлены как доля больных от числа обследованных. Для статистической обработки данных применяли χ^2 критерий Пирсона, значения менее 0,05 расценивали как значимые.

Результаты. Из обследованных 596 пациентов эрозивные поражения пищевода были выявлены у 104 (17,4%) детей. При анализе гендерных особенностей установлено, что среди мальчиков ЭЭ был выявлен у 66 (27,7%), а среди девочек — у 38 (10,6%; $\chi^2 = 29,076$, $p < 0,001$). Детей младшего школьного возраста было 46 (44,2%), старшего школьного возраста — 58 (55,8%). При оценке степени выраженности эрозивных поражений пищевода на момент обследования чаще выявлялись эпителизированные эрозии — у 93 (89,4%) детей. При оценке по Лос-Анжелесской классификации установлено, что ЭЭ стадии А выявлен у 94 (90,4%) детей, стадии В и С — у 10 (9,6%), из них стадия В — у 8 (7,7% от общего числа детей с ЭЭ), стадия С — у 2 детей (1,9% от общего числа детей с ЭЭ). ЭЭ в стадии D не выявлен.

Заключение. Распространённость эрозивных поражений пищевода у детей школьного возраста с гастроэнтерологическими симптомами составляет 17,4%. Эрозивные поражения пищевода с равной частотой встречаются у пациентов младшего и старшего школьного возраста. Среди пациентов с ЭЭ преобладают мальчики. Чаще выявляется ЭЭ стадии А, реже стадии В и С.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭРОЗИВНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПИЩЕВОДА У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Пименова Д.В., Прокудина М.П.

Научный руководитель: к.м.н., доцент

Д.Ю. Латышев

Алтайский государственный медицинский университет
Минздрава России, Барнаул

Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, дети, эрозивный эзофагит

Актуальность. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) является распространённым заболеванием, определяемым попаданием желудочного содержимого в пищевод, вызывающим неприятные симптомы и/или осложнения. Распространённость симптомов ГЭРБ у детей может достигать 2–7%, а среди детей с гастроэнтерологическими симптомами — 8,7–17%. Изучение распространённости ГЭРБ в детской популяции остаётся актуальной задачей.

Цель: определить распространённость эрозивного эзофагита (ЭЭ) у детей школьного возраста с клиническими проявлениями диспепсии.

Материалы и методы. В ретроспективное когортное исследование включены 596 детей (238 мальчиков и 358 девочек). Всем больным было проведено эндоскопическое исследование: фиброгастродуоденоскопия и эзофагогастродуоденоскопия, позволяющие провести визуальный осмотр слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки при помощи эндоскопа. Диагноз ЭЭ выставлен в соответствии с Лос-Анжелесской клас-