

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ПРОРЕЗЫВАНИИ ЗУБОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ СИМПТОМОВ

Павлова А.П.

Научный руководитель: канд. мед. наук
А.А. Скакодуб

Первый Московский государственный медицинский
университет имени И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет), Москва, Россия

Ключевые слова: *дети; прорезывание зубов; местные
препараты; патологические симптомы; воспаление*

Актуальность. Прорезывание зубов является неотъемлемым этапом в жизни каждого ребёнка. Часто этот процесс сопровождается местными патологическими симптомами, которые могут привести к нарушению общего состояния организма, что требует медицинского вмешательства для облегчения симптомов и предупреждения осложнений. **Цель:** определить эффективность использования местных препаратов при прорезывании зубов в зависимости от тяжести симптомов.

Материалы и методы. На протяжении 7 дней наблюдали 52 ребёнка в возрасте от 5 мес до 3 лет, соответствующем периоду прорезывания временных зубов. В зависимости от степени тяжести проявления патологических изменений слизистой оболочки полости рта были выделены 3 группы: 1-я ($n = 18$) — дети с лёгкими изменениями; 2-я ($n = 26$) — с умеренными; 3-я ($n = 8$) — с тяжёлыми. Для облегчения симптомов назначали местные препараты на 7–12 дней.

Результаты. В 1-й день наблюдения у всех детей отмечались болезненность при пальпации, гиперемия и отёк слизистой оболочки, которые приводили к возникновению беспокойства при приёме пищи и во сне, а также повышению температуры тела у 80%, 99% и 100% детей 1–3-й групп соответственно. У 55% детей 2-й группы выявлены расстройства пищеварения. Основное отличие детей 3-й группы заключалось в развитии припухлости окружающих мягких тканей и гиперемии с цианотичным оттенком у 100% детей этой группы, гематомы прорезывания и вторичной инфекции у 25%. На 7-й день применения местных препаратов у детей всех групп купировались такие симптомы, как отёк слизистой, субфебрильная температура, нарушения сна и расстройства пищеварения. Лишь у 2% детей остались минимальные проявления гиперемии и беспокойства во время приёма пищи.

Выводы. Использование местных препаратов во время прорезывания временных зубов значительно облегчает этот процесс независимо от тяжести симптомов. Местное влияние на слизистую оболочку полости рта уменьшает воспаление, что обеспечивает уменьшение осложнений, влияющих на здоровье ребёнка.

* * *