

* * *

АСПРОСТРАНЁННОСТЬ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ У ДЕВОЧЕК

Ольгушкина Г.В., Алексеева О.В., Логинова Н.Г.

Пензенский государственный университет, Пенза, Россия

Ключевые слова: *девочки; гинекологические
заболевания; инфекция мочевых путей; диагностика*

Актуальность. На формирование репродуктивного здоровья оказывают влияние многочисленные факторы, в том числе различные соматические заболевания. Инфекция мочевых путей (ИМП) занимает среди них ведущее место. Частота этой патологии выше у девочек, что обусловлено анатомо-физиологическими особенностями. Влияние гинекологической патологии на течение ИМП является ак-

туальной темой. **Цель:** определить распространённость гинекологических заболеваний у девочек при ИМП.

Материалы и методы. Обследовано 129 девочек с ИМП в возрасте от 6 мес до 12 лет, которые были распределены по возрасту на 3 группы: 1-я группа (от 6 мес до 3 лет) — 39 детей; 2 группа (4–7 лет) — 46 детей; 3-я группа (8–12 лет) — 44 ребёнка. Все девочки были осмотрены гинекологом, проводилось микроскопическое и бактериологическое исследование влагалищного отделяемого; УЗИ гениталий — по показаниям.

Результаты. У 45,7% девочек с ИМП были диагностированы гинекологические заболевания, чаще они регистрировались у девочек 1-й группы ($p < 0,05$). Ведущими формами патологии у девочек во всех группах наблюдения были вульвиты и вульвовагиниты неспецифической этиологии, соответственно у детей 1-й группы — у 53,8%, 2-й — у 34,8%, 3-й — у 27,4%. При этом 64,4% обследованных девочек с гинекологической патологией имели рецидивирующее течение ИМП. У 13,5% девочек 1-й и 2-й групп было установлено сочетание синехий малых половых губ и вульвовагинита. Такие сочетанные формы патологии были диагностированы у девочек с острым пиелонефритом.

Заключение. Выявлена высокая частота гинекологических заболеваний у девочек с ИМП, преимущественно в возрасте до 3 лет. Среди форм гинекологической патологии у девочек всех возрастных групп доминировал неспецифический вульвовагинит. Установленные закономерности определяют необходимость проведения своевременных профилактических и лечебных мероприятий по выявлению и лечению гинекологических заболеваний у девочек с ИМП.

* * *