

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ТЕЧЕНИЯ КОРИ У ДЕТЕЙ

Муленкова А.В., Сулопарова П.С., Багнюк Е.М.,
Буганова Е.Р., Миронова О.А., Чиркина М.В.

Научные руководители: проф. Г.И. Смирнова,
проф. А.А. Корсунский

Первый Московский государственный медицинский
университет имени И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский университет), Москва, Россия

Ключевые слова: дети, корь, диагностика, лечение,
осложнения

Актуальность. Корь — высококонтагиозная вирусная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путём, протекающая с характерной клинической картиной. По данным ВОЗ, Россия вошла в первую десятку стран по числу больных корью в 2022–2023 гг.

Цель: определить особенности течения кори у детей разного возраста.

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ историй болезни 65 детей, которые были госпитализированы и пролечены в ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского с диагнозом «корь» в период с января 2022 г. по октябрь 2023 г. Критерием включения являлось серологическое подтверждение диагноза. Все больные были распределены на 3 группы по возрасту: 1-я группа — от рождения до 1 года ($n = 16$); 2-я группа — от 1 до 5 лет ($n = 27$); 3-я группа — от 7 до 17 лет ($n = 22$).

Результаты. Доля детей, не привитых из-за отказа или медицинского отвода, в 3-й группе составила 87,5% ($n = 19$), во 2-й — 70,4% ($n = 15$). Среднетяжёлое течение наблюдалось у 16 (100%) детей 1-й группы, тяжёлое течение было у 7 (33,3%) детей 3-й группы. При поступлении у всех детей фиксировались жалобы на лихорадку, сыпь, кашель, заложенность носа, явления интоксикации, экзантема и катаральные явления. У детей 3-й группы часто выявляли пятна Филатова (82%; $n = 18$), энантему (23%; $n = 5$), лимфаденопатию (77,3%; $n = 17$). Осложнения чаще развивались у детей 3-й группы (67%; $n = 14$), в том числе синдром системного воспалительного ответа (4,5%; $n = 1$); в 1-й группе у детей осложнения встретились с частотой 62,5% ($n = 10$), у детей 2-й группы — 59% ($n = 16$). Пневмония развивалась у каждого 5-го ребёнка 1-й группы ($n = 3$) и каждого 10-го больного 2-й и 3-й групп ($n = 9$; $n = 11$ соответственно). Перенесённый COVID-19 был у 16 (24,6%) детей: 1-я группа — у 1 (6,25%), 2-я — у 6 (22,2%), 3-я — у 9 (41%), сопутствующая респираторная инфекция — у 2 (12,5%), 7 (26%), 2 (9%) детей 1–3-й групп соответственно.

Выводы. Дети в возрасте 7–17 лет чаще переносили корь в тяжёлой форме с осложнениями. Среди всех наблюдавшихся больных высока доля перенесённого COVID-19 (24,6%; $n = 16$), что может быть следствием уменьшения иммунной защиты и повышения восприимчивости организма к другим инфекциям. Низкая доля вакцинированных детей отражает негативные последствия пандемического кризиса на здравоохранение и нерешительность родителей в отношении вакцинации.

* * *